

CUIDADOS A SE TOMAR NA SUSPEITA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19 PELO PACIENTE OU POR UM FAMILIAR

SE O PACIENTE OU FAMILIAR APRESENTA SINTOMAS DA COVID-19:

- Não realizar consulta odontológica e orientar sobre a procura de atendimento médico, quando indicado (informações são passadas de maneira remota, por telefone, whatsapp, dentre outros).

SE O PACIENTE OU FAMILIAR TESTOU POSITIVO PARA A COVID-19:

- Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por, no mínimo, 14 dias;
- Utilizar máscaras em tempo integral;
- Se apenas uma pessoa for infectada, deve-se ficar em isolamento dentro de um ambiente em que os outros integrantes da família não tenham acesso;
- Caso outro familiar da casa apresente os sintomas, a família deve reiniciar o isolamento. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica;
- Manter a distância mínima de 1 metro entre a pessoa infectada e os demais moradores;
- Os demais moradores devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada;

CUIDADOS A SE TOMAR NA SUSPEITA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19 PELO PACIENTE OU POR UM FAMILIAR

SE O PACIENTE OU FAMILIAR TESTOU POSITIVO PARA A COVID-19 (continuação):

- Limpar a casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%;
- Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente;
- Manter ambiente ventilado;
- Objetos como: toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros devem ser separados apenas para uso da pessoa infectada;
- O lixo produzido por ela precisa ser separado e descartado corretamente;
- Roupas e roupas de cama do contaminado devem ser lavados separadamente;

QUANTO TEMPO A PESSOA INFECTADA DEVE FICAR ISOLADA?

- Alguns pacientes com COVID-19 podem espalhar o vírus de 24 a 48 horas antes do início dos sintomas e de 3 a 4 semanas após o início dos sintomas;
- De acordo com a OMS, o paciente deve ser liberado do isolamento após terem dois testes negativos, com pelos menos 24 horas de intervalo e estejam clinicamente recuperados;
- Se o teste não puder ser realizado, é importante que os indivíduos continuem isolados por mais 2 semanas após o fim dos sintomas.